

**Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek.**

Uputu nemojte baciti. Možda ćete je poželjeti ponovno pročitati.

Za sve dodatne obavijesti obratite se svojem liječniku ili ljekarniku

Ovaj lijek liječnik je propisao samo za Vas. Nemojte ga davati nikomu drugom, čak i ako ima iste simptome kao i Vi, jer bi mu mogao štetiti.

**Uputa sadrži:**

1. Stoje Maxidex i za što se upotrebljava
2. Što morate znati prije nego uzmete Maxidex
3. Kako upotrebljavati lijek Maxidex
4. Mogući neželjeni učinci
5. Čuvanje i rok valjanosti

**MAXIDEX 1 mg/ml kapi za oko, suspenzija  
(dexamethasonum)**

Djelatna tvar je deksametazon 1 mg/ml

Pomoćne tvari su slijedeće: bezvodni dinatrij-hidrogenfosfat (E339), polisorbitat 80 (E433), dinatrij-edetat, natrij-klorid, benzalkonij-klorid, hipromeloza (hidroksipropilmetilceluloza, E464) i pročišćena voda. Za očuvanje pH vrijednosti dodane su manje količine limunske kiseline monohidrat i/ili natrij hidroksida.

**Nositelj odobrenja je ALCON FARMACEUTIKA d.o.o., Vlaška 82, Zagreb**

**Proizvođač je SA ALCON-COUVREUR NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija.**

**1. ŠTO JE MAXIDEX I KAKO DJELUJE**

**Maxidex kapi za oči upotrebljavaju se za liječenje neinfektivnih vanjskih upalnih i alergijskih stanja oka, uključujući postoperativne upale.**

**Maxidex spada u skupinu lijekova** koje nazivamo kortikosteroidi. Djeluje tako da sprječava ili olakšava upale u oku.

Maxidex je tekućina (bijela do svijetložuta neprozirna suspenzija bez aglomerata), dostupna u pakiranju s 5 rnl bočicom s oznakom za otvaranje (DROP-TAINER) i poklopcem sa sigurnosnim navojem, na kojem se jasno vidi ukoliko je bočica otvarana.

**2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO UPOTRIJEBITE MAXIDEX**

Ne koristite MAXIDEX ;

Ukoliko ste osjetjivi (alergični na) deksametazon ili bilo koji sastojak lijeka

Maxidex kapi za oči, suspenzije

Ukoliko imate, ili sumnjate na infekciju oka


Budite posebno pažljivi prilikom uporabe lijeka MAXIDEX:

**ukoliko se liječite zbog herpes simpleksa.** Ukoliko se stanje pogorša ili nastavi, posavjetujte se s liječnikom.

**u slučaju dugotrajne ili učestale primjene MAXIDEX kapi** postoji mogućnost povišenja intraokularnog tlaka, pojave katarakte, iii postoji mogućnost da postanete osjetljiviji na očne infekcije. Vaš liječnik će Vam sukladno potrebi redovito kontrolirati oči.

**ukoliko imate glaukom.** MAXIDEX može uzrokovati povišenje očnog tlaka, stoga će Vam liječnik prema potrebi redovito kontrolirati očni tlak.

**primjena kortikosteroida** može prikriti ili pojačati akutnu gnojnu infekciju oka.



**kod bolesti koje uzrokuju stanjenje rožnice i bjeloočnice.** Dugotrajna vanjska primjena kortikosterioda može dovesti do perforacije rožnice i bjeloočnice.  
**pridržavajte se vremena trajanja liječenja koje vam je propisao liječnik.** Nemojte prestati uzimati lijek prije isteka propisanog vremena. Ukoliko Vam se stanje pogorša ili se bolest nastavlja obavijestite o tomu svog liječnika. Lokalna primjena kortikosterioda može usporiti proces zacjeljivanja rana na oku

**Značajne informacije o nekim sastojcima lijeka MAXIDEX:**

**Ukoliko nosite meke kontaktne leće,** ne primjenjujte kapi za oči dok nosite leće. Kontaktne leće treba izvaditi prije ukapavanja lijeka, a ponovo se mogu staviti 15 minuta nakon ukapavanja lijeka. Konzervans u lijeku MAXIDEX (benzalkonij klorid) mijenja boju mekih kontaktnih leća.

Sigurnost i učinkovitost primjene kod djece nije dokazana.

**Trudnoća i dojenje**

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

**Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima**

Moguće je privremeno zamagijenje vida nakon primjene MAXIDEX kapi za oči. Sve dok se vid ne razbistri treba izbjegavati upravljanje vozilima i strojevima.

**Primjena drugih lijekova**

Obavijestite svojega liječnika o lijekovima koje ste uzimali prije, koje uzimate ili ćete uzimati uključujući i lijekove koje kupujete bez recepta.

**3. KAKO UPOTREBLJAVATI MAXIDEX**


Pridržavajte se liječničkih uputa. O svim nedoumicama, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Uobičajeno doziranje kod kroničnih upala je jedna ili dvije kapi u oko/oči svakih tri do šest sati. U slučaju jake ili akutne upale liječnik može povećati dozu na jednu ili dvije kapi u oko svakih 30 do 60 minuta, do znakova poboljšanja. U nastavku se terapija postupno smanjuje do potpunog prestanka.

Kod alergija i blažih upala uobičajeno doziranje je jedna do dvije kapi u oko ili oči svaka tri do četiri sata.


Liječnik će Vas obavijestiti koliko će vremena trajati liječenje.

MAXIDEX kapi primjenjujte samo za oči.



**Koliko lijeka upotrijebiti**

1. Uzmite bočicu lijeka MAXIDEX i ogledalo
2. Prije ukapavanja dobro oprati ruke.
3. Dobro protresite bočicu.
4. Otvorite poklopac.



5. Bočicu držite okrenuto naopako, između palca i srednjeg prsta
6. Zabacite glavu prema natrag. Donju vjeđu lagano povucite prema dolje, tako da nastane spojnični džep između očne jabučice i same donje vjeđe (slika 2).
7. Vrh kapaljke približite oku. Ukoliko Vam pomaže, koristite ogledalo.
- 8. Izbjegavajte dodir kapaljke s okom, prstima ili drugom površinom.**
9. Laganim pritiskom kažiprsta na dno okrenute bočice istisnite po jednu kapljicu lijeka MAXIDEX (slika 3)
10. Nakon ukapavanja lijeka MAXIDEX otpustite donju vjeđu, zatvorite oko i lagano prstom pritisnite jamicu između medijalnog očnog kuta i nosa (slika 4). To će spriječiti, da MAXIDEX kapi odu u druge dijelove tijela.
11. Ako primjenjujete kapljice na oba oka, ponovite ove korake na drugom oku.
12. Bočicu dobro zatvorite nakon primjene.
13. Upotrebljavajte samo jednu bočicu istovremeno.

**Ako** promašite oko, pokušajte ponovno.

**Ako ste zaboravili ukapati** MAXIDEX, ukapajte jednu dozu čim se sjetite. Ako je blizu vrijeme za novu dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uobičajenim režimom primjene. Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu dozu.

**Ako ste upotrijebili veću dozu MAXIDEX kapi od propisane**, po potrebi isperite oko s mlakom vodom.

**Ako istovremeno koristite druge lijekove za oči**, pričekajte najmanje 10 do 15 minuta između primjene MAXIDEX kapi i ostalih lijekova.

#### 4. MOGUĆI NEŽELJENI UČINCI

Kao i svi lijekovi, i MAXIDEX može imati neželjene učinke.

**Vrlo rijetki neželjeni učinci:** javljaju se kod 1 od 10,000 ljudi:

Učinci na oko: povišen očni tlak, nelagodan osjećaj u oku, proširena zjenica, osjetljivostoka, nenormalan osjećaj u oku, obješenost vjeđe.

Uobičajeno možete nastaviti sa primjenom kapljica, osim u slučaju pojave ozbiljnih neželjenih učinaka. Ukoliko niste sigurni, posavjetujte se s svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako se u Vas pojave neuobičajene tegobe koje nisu navedene u ovoj uputi, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

#### 5. ČUVANJE I ROK VALJANOSTI

**Bočicu bacite 4 tjedna nakon prvog otvaranja.**

Na crti ispod zapišite datum kada ste otvorili bočicu.

Otvoreno:

Lijek čuvajte izvan dohvata djece.


Čuvajte na temperaturi do 8- 25° C.

Ne zamrzavajte.

Bočicu držite u uspravnom položaju.

Držite poklopac dobro zatvoren.

Lijek se ne smije primjenjivati nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakovanju



6. DODATNE INFORMACIJE

Uputa o lijeku

Za sve informacije o lijeku obratite se na slijedeću adresu:

ALCON FARMACEUTIKAd.o.o.  
Vlaška 82, Zagreb Tel 014611 988

Način izdavanja lijeka: Lijek se izdaje na recept, u ljekarnama.

Uputa je odobrena Mjesec/godina

