

UPUTA O LIJEKU

NACLOF

diklofenak

Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu o lijeku prije nego počnete primjenjivati vaše kapi za oči. Ova uputa o lijeku sadrži važne informacije o vašim kapima za oči. Ako imate dodatnih pitanja ili ste nesigurni zbog nečega, molimo da se za savjet obratite svom liječniku ili ljekarniku.

ŠTO TREBATE ZNATI O NACLOF kapima za oči

Djelatna tvar u Naclof kapima za oči je diklofenak-natrij. Jedan mL otopine sadržava 1,0 mg diklofenak-natrija.

Pomoćne tvari su benzalkonij-klorid (konzervans), natrij-edetat, hidroksipropil- γ -ciklodekstrin, kloridna kiselina, razrijeđena, propilenglikol, trometamol, tiloksapol i voda za injekcije.

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Kapi za oko, otopina; 5 mL otopine.

Farmakoterapijska skupina

Oftalmici, nesteroidni protuupalni pripravci.

Proizvođač

EXCELVISION

Rue de la Lombardière

FR-07100 Annonay

Francuska

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Alcon Farmaceutika d.o.o.

Avenija Dubrovnik 16

10000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja

Na recept, samo u ljekarnama.

ZA ŠTO SE NACLOF KORISTI?

Naclof kapi za oči koriste se:

- za održavanje zjenice otvorenom tijekom kirurškog zahvata na oku,
- za liječenje upale oka povezane s kirurškim liječenjem katarakte ili nakon kirurškog liječenja glaukoma laserom,
- za liječenje bolova i tegoba povezanih s kirurškim liječenjem excimer laserom ili sa slučajnom ne-penetrirajućom ozljedom oka,
- za ublažavanje znakova i simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa u očima (peludna groznica).

Liječnici ponekad ove kapi za oči propisuju i u druge svrhe. Ukoliko se to odnosi na vas, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI KAPI ZA OČI

Prije nego počnete koristiti kapi za oči, posavjetujte se sa svojim liječnikom:

- ako ste alergični na bilo koji od gore navedenih sastojaka lijeka,
- ako ste imali alergijsku reakciju, kožni osip, začepljen nos ili vam se javilo zviždanje pri disanju nakon uzimanja acetilsalicilne kiseline ili bilo kojeg drugog lijeka protiv bolnih stanja u zglobovima ili mišićima,
- ako imate poremećaj zgrušavanja krvi ili uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi, npr. varfarin,
- ako ste trudni ili dojite,
- ako patite od bilo kojeg poremećaja u oku, npr. infekcije, ili uzimate neke druge lijekove za oko.

Kako je poznato da jedan od sastojaka lijeka, benzalkonij-klorid, može obezbojiti meke kontaktne leće, prije primjene Naclof kapi za oči morate skinuti leće. Ne smijete ih ponovno stavljati najmanje 15 minuta nakon primjene kapi za oči.

Ako vam se vid zamuti neposredno nakon primjene kapi, nemojte upravljati motornim vozilima ni strojevima. Pričekajte da se vid razbistri.

DOZIRANJE

Niže su navedene uobičajene doze:

Odrasle i starije osobe:

Prije kirurškog liječenja katarakte.....	Po jedna kap 4 puta tijekom 2 sata prije kirurškog zahvata
Nakon kirurškog liječenja katarakte.....	Po jedna kap 4 puta dnevno do 28 dana
Nakon kirurškog liječenja excimer laserom.....	Po jedna kap svakih 2-5 sati do 24 sata
Nakon slučajne ne-penetrirajuće ozljede.....	Po jedna kap 4 puta dnevno do 2 dana
Nakon kirurškog liječenja glaukoma laserom.....	Po jedna kap 4 puta dnevno do 7 dana
Sezonski alergijski konjunktivitis.....	Po jedna kap u svako oko 4 puta dnevno toliko dugo koliko odredi liječnik
Nakon kirurškog zahvata na rožnici.....	Po jedna kap 4 puta dnevno do 2 dana
Nakon kirurškog liječenja strabizma.....	Po jedna kap 4 puta dnevno tijekom prvog tjedna, po jedna kap 3 puta dnevno tijekom drugog tjedna, po jedna kap 2 puta dnevno tijekom trećeg tjedna, po potrebi tijekom četvrtog tjedna.

Djeca

Lijek primjenjivati samo prema uputama liječnika.

Liječnik vam može savjetovati da lijek primjenjujete na drugačiji način, te se u tom slučaju pridržavajte liječničkih uputa o tome kada i kako koristiti lijek, a također pročitajte i upute na pakovanju lijeka. Ako u nešto niste sigurni, obratite se za savjet ljekarniku.

KAKO SE PRIMJENJUJU KAPI ZA OČI

Ukoliko vam liječnik preporuči da uz Naclof kapi za oči koristite i neke druge kapi za oči, razmak između primjene dviju različitih kapi za oči mora biti najmanje 5 minuta.

1. Operite ruke.
2. Nosite li kontaktne leće, izvadite ih prije primjene kapi i ne stavljajte ih najmanje 5 minuta nakon ukapavanja ako su leće tvrde, odnosno najmanje 15 minuta ako su leće meke.
3. S bočice skinite zatvarač.
4. Uzmite bočicu jednom rukom, držeći je palcem i kažiprstom.
5. Nagnite glavu unatrag i drugom rukom pažljivo povucite donji kapak prema dolje. Vrh bočice prinesite blizu oku, ne dotičući oko ni očni kapak, te blago stisnite bočicu da iz nje istisnete jednu kap.
6. Zatvorite oko, kažiprstom nježno pritisnite kut oka i držite pritisnutim jednu minutu.
7. Postupak ponovite s drugim okom, ako je potrebno.
8. Začepite bočicu i operite ruke.

Napomena: vrhom bočice ne dotičite oko ni bilo koju drugu površinu.

Pažljivo se pridržavajte ovih uputa. Ako bilo što ne razumijete, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Zaboravite li ukapati kapi za oči, učinite to što je prije moguće.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kapi za oči u nekih ljudi ponekad izazivaju nuspojave.

Ti su učinci često blagi i prolaze nakon nekoliko dana liječenja. Ukoliko su nuspojave teške ili potraju duže od nekoliko dana, javite se svome liječniku. Obavijestite svog liječnika i ako vas kapi za oči smetaju na bilo koji drugi način.

Moguće nuspojave su:

- bol, svrbež, crvenilo ili osjećaj pečenja u oku,
- osjećaj da je u oku pijesak ili strano tijelo,
- zamućen vid neposredno nakon primjene kapi,
- neuobičajena osjetljivost na svjetlo.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

ČUVANJE LIJEKA

Lijek čuvajte izvan dohvata i vidokruga djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lijek nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.

Lijek ne koristite duže od 4 tjedna nakon otvaranja bočice.

DATUM REVIZIJE UPUTE

Srpanj, 2011.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET: UP/I-530-09/06-01/343 od 26. ožujka 2007.

H A L M E D
19 3 07 3 2011
O D O B R E N O