

UPUTA O LIJEKU

TOBREX mast za oči (tobramycinum)

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek.

- Uputu nemojte baciti. Možda ćete je poželjeti ponovno pročitati.
- Za sve dodatne obavijesti obratite se svom liječniku ili ljekarniku
- Ovaj lijek liječnik je propisao samo za Vas. Nemojte ga davati nikomu drugom, čak i ako ima iste simptome kao i Vi, jer bi mu mogao štetiti.

Uputa sadrži:

1. Što je TOBREX i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego uzmete TOBREX
3. Kako uzimati lijek TOBREX
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati TOBREX
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE TOBREX I ZA ŠTO SE KORISTI

TOBREX je antibiotik indiciran za liječenje infekcija oka.

TOBREX je antibiotik za lokalno liječenje vanjskih infekcija oka i njegovih adneksa, uzrokovanih osjetljivim bakterijama koje reagiraju na tobramicin, osobito bakterijama koje su rezistentne na većinu ostalih antibiotika, osobito *Pseudomonas aeruginosa*.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI TOBREX

Nemojte uzimati TOBREX:

- U koliko ste osjetljivi na bilo koji sastojak TOBREX masti ili na aminoglikozide


Budite posebno pažljivi sa TOBREX masti:

- u slučaju produljene primjene TOBREX mast. Kao i kod ostalih antibiotika potrebno je pridržavati se uputa liječnika i pažljivo pratiti tijek liječenja.
- u slučaju pojave superinfekcije
- ukoliko koristite druge lijekove. Pročitajte poglavlje Upotreba TOBREX masti sa ostalim lijekovima.

Potražite savjet liječnika ukoliko se bilo koje gore navedeno upozorenje odnosi na Vas ili je to bio slučaj u prošlosti.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.



Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Moguće je privremeno zamagljenje vida nakon primjene TOBREX masti . Sve dok se vid ne razbistri treba izbjegavati upravljanje vozilima i strojevima.

Primjena drugih lijekova

Obavijestite svojega liječnika o lijekovima koje ste uzimali prije, koje uzimate ili ćete uzimati uključujući i lijekove koje kupujete bez recepta.

3. KAKO UZIMATI TOBREX

Pridržavajte se liječničkih uputa. O svim nedoumicama, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Kod blažih upala oka primijenite manju količinu masti 2 do 3 puta dnevno.

Kod jačih upala primijenite manju količinu masti svaka 3 do 4 sata, sve dok ne nastupi poboljšanje, nakon čega se smanjuje učestalost primjene lijeka sve do potpunog ozdravljenja.

Duljina liječenja ovisi o porijeklu infekcije i može trajati od nekoliko dana pa sve do nekoliko tjedana. **Liječnik će Vas obavijestiti koliko će vremena trajati liječenje.**

Kliničkim je ispitivanjima dokazana neškodljivost i djelotvornost primjene tobramicina i kod djece.

TOBREX primjenjujte u oko sukladno preporukama Vašeg liječnika.

Ako ste zaboravili primijeniti TOBREX, primijenite jednu dozu čim se sjetite. Ako je blizu vrijeme za novu dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uobičajenim režimom primjene. Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu dozu.

Ako ste upotrijebili veću dozu TOBREX masti od propisane, po potrebi isperite oko mlakom vodom. Klinički znakovi i simptomi u slučaju predoziranja slični su nuspojavama. Prekinite primjenu i potražite savjet liječnika.

Prijevremeni prekid terapije može izazvati ponovno razbuktavanje infekcije.

Ako istovremeno koristite druge lijekove za oči, pričekajte najmanje 10 do 15 minuta između primjene TOBREX masti i ostalih lijekova.


U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom TOBREX masti obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi TOBREX može izazvati nuspojave.

Svrbež, iritacije i oteknuće kapaka, crvene oči, hiperemija i alergijske reakcije mogu se javiti vezano uz primjenu lijeka.

Uobičajeno možete nastaviti sa primjenom lijeka, osim u slučaju pojave ozbiljnih nuspojava. Ukoliko niste sigurni, posavjetujte se s svojim liječnikom ili ljekarnikom.



Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI TOBREX

Tabu bacite 4 tjedna nakon prvog otvaranja.
Na crti ispod zapišite datum kada ste otvorili tubu.

Otvoreno: _____

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Nema posebnih uputa za čuvanje ovog proizvoda

Držite poklopac dobro zatvoren.

TOBREX se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što TOBREX sadrži

Djelatna tvar je tobramicin 3 mg/ml

Pomoćne tvari su klorobutanol bezvodni 5.0 mg, parafin tekući 50.0 mg i vazelin do 1 g.

Kako TOBREX izgleda

TOBREX mast za oči pakirana je u alu tubu sa 3.5 g masti.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

ALCON FARMACEUTIKA d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, Zagreb

Proizvođač

SA Alcon-Couvreur NV, Rijsweg 14, 2870 Puurs, Belgija

ALCON CUSI, S.A. Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka: Lijek se izdaje na recept, u ljekarnama.

Datum revizije upute 13. srpanj 2009.

