

VAŽNA OBAVIJEST O PROPISIVANJU *Exelon*[®] (rivastigminum) transdermalnog flastera

Poštovani,

U suglasnosti s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, Novartis Hrvatska d.o.o. Vam želi pružiti najnovije informacije vezane uz sigurnost primjene lijeka *Exelon*[®] (rivastigminum) transdermalni flaster.

Predmet: Izravna komunikacija liječnicima o neodgovarajućoj primjeni i medikacijskim pogreškama povezanim s primjenom *Exelon*[®] (rivastigminum) transdermalnog flastera.

Indikacije: *Exelon*[®] transdermalni flaster je indiciran za simptomatsko liječenje blage do umjereno teške Alzheimerove demencije.

Ključne poruke:

- Prijavljeni su slučajevi medikacijskih pogrešaka i neodgovarajuće primjene *Exelon*[®] transdermalnog flastera, od kojih su neki doveli do predoziranja rivastigminom. Simptomi predoziranja uključuju mučninu, povraćanje, proljev, hipertenziju i halucinacije.
- Uzrok koji je bio najčešće prijavljen je neuklanjanje transdermalnog flastera i primjena više od jednog transdermalnog flastera u isto vrijeme.
- Važno je da zdravstveni radnici objasne bolesnicima i skrbnicima kako treba ispravno koristiti *Exelon*[®] transdermalni flaster s posebnim naglaskom na sljedeće:
 - samo jedan transdermalni flaster treba primijeniti svakog dana na zdravu kožu na jednom od preporučenih područja: gornji ili donji dio leđa, ili nadlaktica ili prsa.
 - Transdermalni flaster treba zamijeniti novim nakon 24 sata, a flaster od prethodnog dana se mora ukloniti prije primjene novog flastera na različito područje kože;
 - Kako bi se smanjila iritacija kože, treba izbjegavati primjenu flastera na istom području kože unutar 14 dana.
 - Transdermalni flaster se ne smije rezati na komadiće.

Daljnje informacije o medikacijskim pogreškama i neodgovarajućoj primjeni

Zaprimljena su post-marketinška izvješća o medikacijskim pogreškama i neodgovarajućoj primjeni *Exelon*[®] transdermalnog flastera. Najčešće prijavljene pogreške su bile pogreška u administraciji lijeka, kriva tehnika u procesu uporabe lijeka, i administracija pogrešne doze. Najčešće prijavljivani uzroci bili su neuklanjanje flastera i primjena više od jednog flastera u isto vrijeme. Druge uobičajene pogreške su bile primjena na ne-preporučenim područjima kože ili na istom području kroz nekoliko tjedana, rezanje flastera na nekoliko komada, i

