



02. veljače 2010.

Prilaz baruna Filipovića 29
10000 Zagreb
Croatia

Tel. +385 (0)1 6051 999
Fax. +385 (0)1 6051 996
www.glaxosmithkline.hr

MJERE MINIMIZACIJE RIZIKA PRI UVOĐENJU NOVOG OBLIKA ROPINIROLA

Poštovani,

GlaxoSmithKline d.o.o. Vas u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode želi obavijestiti da je na našem tržištu dostupan **novi oblik** ropirinol tableta

REQUIP MODUTAB®

Requip Modutab® **2 mg** tablete s produljenim oslobađanjem
Requip Modutab® **4 mg** tablete s produljenim oslobađanjem
Requip Modutab® **8 mg** tablete s produljenim oslobađanjem

Requip Modutab® **tablete s produljenim oslobađanjem** u samo **jednoj dnevnoj dozi** omogućuju kontinuirano oslobađanje ropirinola tijekom 24 sata, a kako bi se kontrolirali simptomi Parkinsonove bolesti tijekom dana i noći.

Requip Modutab® tablete s produljenim oslobađanjem se koriste u liječenju Parkinsonove bolesti u slijedećim terapijskim indikacijama:

- početna monoterapija kako bi se odgodilo započinjanje liječenja L-dopom
- u kombinaciji s L-dopom, tijekom bolesti, kada se učinak levodope smanji ili postane nedosljedan te se pojave fluktuacije terapijskog učinka (tzv. "kraj doze" ili "on-off" tip fluktuacije).

Requip Modutab® tablete s produljenim oslobađanjem sadržavaju djelatnu tvar ropirinol, agonist dopamina. U komparativnim studijama između grupa pacijenata koji su koristili Requip Modutab® tablete s produljenim oslobađanjem i onih sa Requip® tabletama s trenutnim oslobađanjem, incidencija nuspojava je bila slična. Molimo Vas da detaljnije informacije potražite u sažetku opisa svojstava lijeka Requip Modutab® tableta s produljenim oslobađanjem .

Requip Modutab® tablete uzimaju se **jednom dnevno**, neovisno o jelu, u približno isto doba dana. Requip Modutab® tablete s produljenim oslobađanjem moraju se progutati cijele te se **ne smiju žvakati, drobiti niti dijeliti**.

