

## UPUTA O LIJEKU

### **MAXITROL mast za oči (dexamethasonum, neomycinum, polymyxinum B)**

**Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek.**

- Uputu nemojte baciti. Možda ćete je poželjeti ponovno pročitati.
- Za sve dodatne obavijesti obratite se svom liječniku ili ljekarniku
- Ovaj lijek liječnik je propisao samo za Vas. Nemojte ga davati nikomu drugom, čak i ako ima iste simptome kao i Vi, jer bi mu mogao štetiti.

**Uputa sadrži:**

1. Što je MAXITROL i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego uzmete MAXITROL
3. Kako uzimati lijek MAXITROL
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati MAXITROL
6. Dodatne informacije

#### **1. ŠTO JE MAXITROL I KAKO DJELUJE**

**MAXITROL mast za oči koristi se za liječenje upala i mogućih infekcija oka. Upala može nastati kao posljedica infekcije ili ozljede oka.**

**MAXITROL je kombinacija kortikosteroida i antibiotika.**

Kortikosteroidi (u ovom slučaju deksametazon) djeluju tako da sprječavaju ili olakšavaju upale u oku. Antibiotici (neomicinsulfat i polimiksin B sulfat) su učinkoviti protiv najčešćih mikroorganizama koji uzrokuju infekciju oka.


#### **2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI MAXITROL**

Ne koristite MAXITROL :

- Ukoliko ste osjetljivi (alergični) na neomicinsulfat, polimiksin B sulfat i/ili deksametazon ili bilo koji sastojak lijeka MAXITROL masti za oči
- Ukoliko imate, ili sumnjate na infekciju oka. Samo Vaš liječnik može odrediti terapiju za Vašu vrstu upale.

Budite posebno pažljivi prilikom uporabe lijeka MAXITROL:

- **ukoliko imate povišen očni tlak (glaukom).** Potražite savjet svog liječnika.
- **u slučaju svrbeža, otečenosti vjeđa, crvenila oka** prestanite kapati MAXITROL i posavjetujte se s liječnikom.
- **pridržavajte se vremena trajanja liječenja koje vam je propisao liječnik.** Ukoliko Vam se stanje pogorša ili se bolest nastavlja obavijestite o tomu svog liječnika
- **u slučaju dugotrajne primjene MAXITROL masti** postoji mogućnost da postanete osjetljiviji na očne infekcije, a može se i usporiti proces zacjeljivanja rana na oku.



**Važno je znati** da se kontaktne leće ne nose dok postoji upala na oku.

Sigurnost i učinkovitost primjene kod djece nije dokazana.

#### **Trudnoća i dojenje**

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

#### **Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima**

Moguće je privremeno zamagljenje vida nakon primjene MAXITROL masti za oči. Sve dok se vid ne razbistri treba izbjegavati upravljanje vozilima i strojevima.

#### **Primjena drugih lijekova**

Obavijestite svojega liječnika o lijekovima koje ste uzimali prije, koje uzimate ili ćete uzimati uključujući i lijekove koje kupujete bez recepta.



### **3. KAKO UZIMATI MAXITROL**

Pridržavajte se liječničkih uputa. O svim nedoumicama, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Uobičajeno doziranje je manja količina (otprilike 1,5 cm) masti u konjunktivalnu vrećicu oboljelog oka ili očiju do tri ili četiri puta na dan.


Liječnik će Vas obavijestiti koliko će vremena trajati liječenje.

MAXITROL mast primjenjujte samo za oči.



#### **Koliko lijeka upotrijebiti**

1. Uzmite tubu lijeka MAXITROL i ogledalo
2. Dobro operite ruke.
3. Otvorite poklopac.
4. Tubu držite između palca i kažiprsta
5. Zbacite glavu prema natrag. Donju vjeđu lagano povucite prema dolje, tako da nastane spojnični džep između očne jabučice i same donje vjeđe (slika 1).
6. Vrh kapaljke približite oku. Ukoliko Vam pomaže, koristite ogledalo.
7. **Izbjegavajte dodir vrha tube s okom, prstima ili drugom površinom.**
8. Lagano istisnite mast (slika 2).
9. Nakon primjene lijeka MAXITROL otpustite donju vjeđu, zatvorite oko i trepnite nekoliko puta da mast prekrije cijelu površinu oka. Zatvorite oko nekoliko sekundi. To će omogućiti zadržavanje lijeka u oku.
10. Ako primjenjujete mast na oba oka, ponovite ove korake na drugom oku.
11. Tubu dobro zatvorite nakon primjene.
12. Upotrebljavajte samo jednu tubu istovremeno.



**Ako promašite oko**, pokušajte ponovno.

**Ako ste zaboravili primijeniti MAXITROL**, primijenite jednu dozu čim se sjetite. Ako je blizu vrijeme za novu dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uobičajenim režimom primjene. Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu dozu.

**Ako ste upotrijebili veću dozu MAXITROL masti od propisane**, po potrebi isperite oko s mlakom vodom.

**Ako istovremeno koristite druge lijekove za oči**, pričekajte najmanje 10 do 15 minuta između primjene MAXITROL masti i ostalih lijekova.

#### 4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, i MAXITROL može izazvati nuspojave

##### **Česte nuspojave**

Učinci na oko: nelagodan osjećaj u oku (prolazni osjećaj pečenja ili probadanja nakon uporabe).

##### **Povremene nuspojave**

Učinci na oko: svrbež oka, povišen očni tlak, crvenilo oka, otjecanje vjeđa, pojačano suzenje, svrbež vjeđa.

Uobičajeno možete nastaviti sa primjenom masti, osim u slučaju pojave ozbiljnih nuspojava. Ukoliko niste sigurni, posavjetujte se s svojim liječnikom ili ljekarnikom.

**Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.**

#### 5. KAKO ČUVATI MAXITROL

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece!.

**Lijek ne koristiti dulje od 28 dana nakon prvog otvaranja.**

Na crti ispod zapišite datum kada ste otvorili tubu.

Otvoreno: \_\_\_\_\_


Čuvajte na temperaturi do 25 C.

Ne zamrzavajte.

Držite poklopac dobro zatvoren.

MAXITROL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Neiskorišteni lijek vratiti liječniku ili ljekarniku.



## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Što MAXITROL sadrži

1 g masti sadržava 1 mg deksametazona, 3.500 IU neomicinsulfata i 6.000 IU polimiksin B sulfata.

Pomoćne tvari su metilparahidroksibenzoat , propilparahidroksibenzoat , bezvodni tekući lanolin i bijeli vazelin.

### Kako MAXITROL izgleda

Maxitrol mast za oči pakirana je u alu tubu sa 3.5 g masti.

### Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

ALCON FARMACEUTIKA d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, Zagreb

### Proizvođač:

S.A. Alcon-Couvreur NV, Rijksweg 14, 2870, Belgija

ALCON CUSI S.A. Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Španjolska

**Način izdavanja lijeka:** Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute 09. studeni 2009.

